

کتاب تست های ناباروری

test in infertility

regulator

رضا پوردست گردان میکروبیولوژیست



آذر ماه

۱۳۹۳

مقدمه

ناباروری به حالتی گفته می شود که شما به مدت شش ماه تا یک سال (بسته به سن شما) به صورت محافظت نشده رابطه جنسی داشته باشید ولی باردار نشوید.

در واقع علامت اصلی ناباروری همان باردار نشدن است و ممکن است شما علاوه بر این علامت هیچ گونه نشانه یا علائم دیگری را مشاهده نکنید. علائم ناباروری به علل ناباروری بستگی دارد. بسیاری از شرایط پزشکی و سلامتی می توانند باردار شدن را دشوار کنند. البته در برخی موارد هیچگونه علت مشخصی برای ناباروری فرد تشخیص داده نمی شود.

اگر شما زیر ۳۵ سال سن دارید و برای یک سال و به صورت مداوم برای بارداری تلاش کرده اید و ناموفق بوده اید به پزشک مراجعه کنید. زنان بالای ۳۵ سال باید بعد از ۶ ماه تلاش به پزشک مراجعه کنند.

آزمایش خون، ادرار و تصویربرداری می تواند برای تشخیص علت ناباروری شما به پزشک کمک کند.

در مردان آزمایش اسپرم به عمل می آید که در آن تعداد اسپرم ها و سلامت آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

ممکن است پزشک شما را به یک متخصص عدد تناسلی ارجاع دهد. متخصص عدد تناسلی در ابتدا سوالاتی در مورد سابقه پزشکی و همچنین علائم ناباروری شما خواهد پرسید.

قبل از مراجعه به پزشک سعی کنید موارد زیر را در ذهن داشته باشید:

۱. تمام داروهایی که مصرف می کنید از جمله داروهایی که پزشک برای شما تجویز کرده است، ویتامین ها، مواد معدنی و مکمل ها و همچنین هر نوع داروی بدون نسخه دیگری که مصرف می کنید.

۲. هر چند وقت یک بار برای باردار شدن تلاش می کنید؟ چه مدت است برای بارداری اقدام کرده اید؟ آخرین باری که اقدام کرده اید کی بوده است؟

۳. تغییرات و علائمی که در بدن شما رخ داده است و شما متوجه آنها شده اید.

۴. سابقه هر گونه عمل جراحی و یا اقدامات درمانی، به ویژه اگر به سیستم تناسلی شما مربوط می شود.

۵. سابقه شیمی درمانی و یا رادیودرمانی

۶. میزان مصرف سیگار، الکل یا مواد مخدر (در صورت مصرف)

۷. هر گونه سابقه بیماری های مقابله

۸. هر گونه اختلال ژنتیکی یا بیماری مزمن مانند دیابت و یا بیماری های تیروئید در خود شما و یا خانواده تان

و در آخر اینکه بدن خودتان را زیر نظر داشته باشید و در صورت مشاهده هر گونه تغییر یا علائمی به پزشک خود اطلاع دهید. تشخیص به موقع مشکل ناباروری می تواند شانس درمان و در نتیجه باردار شدن را افزایش دهد.

Testosterone test

تست تستوسترون

کمبود آندروژن نیز زمانی اتفاق می‌افتد که بافت‌های بدن برای کارکرد طبیعی خود، به میزان کافی در معرض آندروژن برای افرادی که سطح تستوسترون بدنشان (TRT) و تستوسترون قرار نمی‌گیرند. البته با درمان جایگزین تستوسترون پایین‌تر از حد نرمال است، هنوز جای امیدواری هست

چه کسانی در خطر ابتلا هستند؟

با اینکه مردان جوان زیاد دچار کمبود تستوسترون نمی‌شوند، ایجاد حالت‌های خاص که باعث توانایی بدن برای تولید تستوسترون را مختل می‌کند، ممکن است در هر سنی مردان را گرفتار کند. در واقع، تقریباً یک در دویست نفر از مردان زیر ۶۰ سال از کمبود آندروژن رنج می‌برند
میزان تستوسترون بدن مردان، معمولاً با بالا رفتن سن کاهش می‌یابد. این مشکل از سن ۴۰ سالگی شروع شده و هر سال تقریباً ۳٪ از میزان تستوسترون بدن را کاهش می‌دهد. اینطور برآورده شده است که حدود ۲۰٪ از مردان بالای ۶۰ سال با کاهش تولید آندروژن مواجه می‌شوند که این خود برای ابتلا به کمبود آندروژن کافی است
برای تشخیص اینکه آیا دچار کمبود هستید و چه عواملی باعث آن شده است، پزشک با آزمایش خون میزان تستوسترون خون شما را اندازه‌گیری می‌کند. پزشکان کاهی علاوه بر اندازه‌گیری میزان تستوسترون، میزان پرولاکتین بدن را نیز اندازه‌گیری می‌کنند تا اطمینان یابند غده‌ی هیپوفیز شما به درستی کار می‌کند.

آزمایشات مجدد خون، مثل سِرُم

FSH، LH

و آزمایش تیروئید نیز گاهی مورد نیاز است

میزان نرمال تستوسترون باید بین ۲۵۰ تا ۸۰۰ نانوگرم در هر یکدهم لیتر خون باشد.

البته این میزان فرد به خاطر شرایط روز، فصل و میزان فعالیت متفاوت خواهد بود.

بنابراین پزشک برای تشخیص کامل و صحیح، آزمایشات کلی را برای بدن انجام خواهد

داد

عوامل دخیل در ایجاد کمبود آندروژن عبارتند از

برخی درمانها، به ویژه آندسته از درمانهایی که برای رفع افسردگی یا اختلالات روانی

صورت می گیرد

شیمی درمانی یا پرتو درمانی برای درمان سرطان که موجب آسیب رسیدن به آلت

جنسي می شود

بیماریهای مزمن

بدکاری غده ی هیپوفیز (غده ای در معز که ماده ای ترشح می کند که تولید هورمون


از معز به بیضه را تنظیم می کند)

هموکروماتوز (بالا بودن میزان آهن بدن)

هیپوگونادیسم (زمانیکه بیضه قادر به تولید میزان کافی تستوسترون، اسپرم یا آندروژن نیست)

بیماری های التهابی مثل سارکوئیدوز (حالتی که موجب جراحت یا عفونت آلت جنسی می شود)

بیماری هایی مثل ایدز که به سیستم ایمنی بدن صدمه میزند
استرس زیاد که بر سیستم کلیوی فشار وارد می کند



Diagnosis of low testosterone

روش تشخیص کاهش تستوسترون

Blood test

تست خون

Hormonal test

تست هورمونی

- ✓ Reference
- ✓ Endometriosis. (2010, September 11). Mayo Clinic. Retrieved July 31, 2012, from <http://www.mayoclinic.com/health/endometriosis/DS00289>
- ✓ from <http://www.mayoclinic.com/health/infertility/DS00310>
- ✓ Infertility FAQs. (2012, April 19). Centers for Disease Control and Prevention. Retrieved July 19, 2012, from <http://www.cdc.gov/reproductivehealth/Infertility/>
- ✓ Infertility treatment: When nature needs a helping hand. (2005, November 15). Cleveland Clinic. Retrieved July 24, 2012, from

Testicle biopsy

بیوپسی بیضه

نمونه برداری از بیضه که اصطلاح پزشکی آن بیوپسی بیضه می باشد عبارت از برداشتن یک تکه کوچک از بیضه یک یا هر دو طرف برای بررسی در آزمایشگاه از نظر وجود فرایند تولید اسپرم می باشد. فرایند تولید اسپرم در مردان در بیضه در داخل لوله های منی ساز صورت می گیرد. در داخل لوله های منی ساز سلولهای زایا وجود دارند این سلولهای زایا پس از ۶ مرحله و ۶۴ روز تبدیل به اسپرم بالغ می شوند

این سلولهای زایا تا چه مرحله ر داخل لوله های منی ساز سلولهای زایا وجود دارند یانه؟
ای تکامل پیدا می کنند؟ گاهی تکامل سلولهای زایا برای تبدیل به اسپرم بالغ کامل نیست
مثلا در مرحله سوم متوقف می شود

آیا اسپرم بالغ در داخل لوله های منی ساز وجود دارد یا نه؟

اکثرا نمونه برداری از بیضه برای تشخیص قدرت باروری مرد است. برای نمونه برداری از بیضه
باید دو شرایط زیر فراهم باشد

در مایع منی بیمار اسپرم وجود نداشته باشد

هورمونهای بیمار طبیعی باشند آزواسپرمی، تعداد اسپرمها صفر
نمونه برداری از بیضه کاهی برای بدست آوردن اسپرم برای انجام لفاح مصنوعی مثل

IUI و یا IVF

انجام می شود. هر بیمار مبتلا به آزواسپرمی نیاز به نمونه برداری از بیضه ندارد. اگر علت
آزواسپرمی فقدان دو طرفه لوله های منی بر باشد، لزومی به نمونه برداری از بیضه نیست.
سابق بر این فقط یک نمونه از بیضه برای بررسی برداشته می شد.


ولی امروزه مشخص شده است که فرایند تولید اسپرم در نقاط مختلف بیضه متفاوت است.
این بویژه در مردان مبتلا به آزواسپرمی بیضوی صدق می کند. اگر بیمار در سرتاسر بیضه
فاقد فرایند تولید اسپرم باشد، آنرا نارسانی کامل بیضه می گویند ولی ممکن است یک
قسمت از بیضه اسپرم تولید نکند، که به آن نارسانی نسبی بیضه در تولید اسپرم می گویند.
در نمونه برداری از بیضه ممکن است نمونه از آن قسمتی برداشته شود که فاقد فرایند تولید
اسپرم می باشد ولی سایر قسمتهاي بیضه طبیعی هستند. بنابراین تکیه مطلق بر حواب یک
نمونه برداری از بیضه صحیح نیست. امروزه توصیه می کنند که بیضه به چهار قسم تقسیم
شده و حداقل از هر قسمت یک نمونه برداری انجام شود


در گذشته نمونه برداری از بیضه فقط نقش تشخیصی داشت، ولی امروزه در بیشتر موارد زمینه از قبل فراهم می شود که اگر در حین نمونه برداری از بیضه مشخص شود که نمونه حاوی اسپرم است، از اسپرم‌های موجود برای لقاح مصنوعی استفاده شود.

اگر امکان لقاح مصنوعی وجود نداشت می توان نمونه را منجمد

(Freeze)

ساخت و بعدا از آن برای لقاح مصنوعی استفاده نمود





✓ Reference

- ✓ How is testicular cancer diagnosed? (2012, May 14). American Cancer Society. Retrieved July 5, 2012, from <http://www.cancer.org/Cancer/TesticularCancer/DetailedGuide/testicular-cancer-diagnosis>
- ✓ Male infertility. (2011, January). American Urological Association Foundation. Retrieved July 5, 2012, from <http://www.urologyhealth.org/urology/index.cfm?article=102>
- ✓ Testicular biopsy. (2011, January 31). Kaiser Permanente. Retrieved July 7, 2012, from <http://healthy.kaiserpermanente.org/>
- ✓ Testicular biopsy. (2010, September 3). *MedlinePlus Medical Encyclopedia*. Retrieved July 5, 2012, from <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003908.htm>

Cortisol test

تست کورتیزول

بدن دارای ۲ عدد غده فوق کلیه می‌باشد که در بالای کلیه‌ها قرار دارند. این غده، یک غده درون ریز است و با ترشح هormون‌ها، سلامت بافت‌ها و اعضای بدن را حفظ می‌کند.

غده فوق کلیه، به دو بخش تقسیم می‌شوند: بخش داخلی (مدولا) و بخش خارجی (کورتکس)

بخش خارجی، هormون‌هایی به نام کورتیکواسترونید می‌سازد. این هormون‌ها شامل: گلوكورتیکونیدها، مینرالوکورتیکونیدها و هormون‌های جنسی مردانه (اندروژن‌ها) هستند.

گلوكورتیکونیدها: کورتیزول یکی از آنهاست که باعث تبدیل خدا به انرژی می‌شود و نقش مهمی را در پاسخ سیستم ایمنی بدن ایفا می‌کند. این هormون باعث کاهش استرس نیز می‌گردد.

مینرالوکورتیکونیدها: آلدوسترон یکی از آنهاست که باعث حفظ تعادل سدیم و پتانسیم خون می‌شود. این هormون، فشار خون و آب بدن را ثابت نگه می‌دارد.

اندروژن‌ها

این هormون‌ها باعث

و توسعه توده عضلانی در مردان و زنان می‌شوند [میل جنسی](#)

آزمایش خون کورتیزول ممکن است در حدود ساعت ۸ صبح گرفته شود، زمانی که کورتیزول باید در اوچ خود باشد، و دوباره در حدود ۴ بعد از ظهر، وقتی که سطح باید کاهش یابد.

گاهی اوقات یک نمونه استراحت در اواخر شب، زمانی که باید در کمترین غلظت خود در خون باشد (در حدود نیمه شب) گرفته می شود. گرفتن بیش از یک نمونه، اجازه می دهد تا پزشک الگوی روزانه ترشح کورتیزول را ارزیابی کند. یک نمونه در صبح ممکن است برای تشخیص کاهش غلظت کورتیزول کافی باشد

گاهی اوقات ادرار برای کورتیزول آزمایش می شود، که معمولاً نیاز به جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته دارد، اما گاهی اوقات ممکن است بر روی نمونه ادرار جمع آوری شده در صبح کار شود. نمونه ادرار ۲۴ ساعته ممکن است برای اندازه گیری میزان کورتیزول آزاد (نه پروتئین متصل) درخواست شود. این نمونه، مقدار تمام کورتیزول غیرمتصل ترشح شده در ادرار را نشان می دهد، اما امکان ارزیابی تغییرات در ترشح کورتیزول را به پزشک نمی دهد

تست کورتیزول بزاق می تواند انجام شود. اگر چه نمونه گیری، استرس کمتری نسبت به خون‌گیری دارد، نیاز به مراقبت ویژه در تهیه نمونه دارد. اغلب، نمونه بین ۱۱ شب و نیمه شب، هنگامی که کورتیزول به طور طبیعی در پایین ترین سطح خود قرار دارد، برای کمک به تشخیص سندروم کوشینگ جمع آوری می شود

مقدار ناکافی کورتیزول باعث ایجاد علائم غیراختصاصی مانند کاهش وزن، ضعف عضلانی، خستگی

فشار خون پایین و درد شکمی می شود. گاهی اوقات کاهش تولید، در ترکیب با عامل استرس را

می تواند بحران آدنال ایجاد کند که نیاز به توجه فوری پزشکی دارد
کورتیزول بیش از حد، می تواند باعث افزایش فشار خون، قند خون بالا، چاقی، پوست شکننده، رگه های بنفش بر روی شکم، ضعف عضلانی و پوکی استخوان شود. زنان ممکن است دوره قاعده‌گی نامنظم و افزایش موهای صورت داشته باشند؛ کودکان ممکن است رشد تأخیری و

کوتاهی قد داشته باشند

causes of high cortisol

علل بالا بودن کورتیزول

Cushing syndrome
سندروم کوشینگ

Tumor in adrenal gland
تومور در غده آدرنال

Causes of low cortisol

علل کاهش کورتیزول

Addison disease
بیماری آدیسون

Hypopituitarism
کم کاری غده هیپوفیز

- ✓ Reference
- ✓ Acute adrenal crisis.(n.d.). *The NY Times Health Guide*. Retrieved April 19, 2012, from <http://health.nytimes.com/health/guides/disease/acute-adrenal-crisis/overview.html>
- ✓ Addison's disease. (n.d.). *Mayo Clinic*. Retrieved April 19, 2012, from <http://www.mayoclinic.com/health/addisons-disease/>

Semen analysis

آنالیز مایع منی

مایع منی علاوه بر اسپرم از ۶۵ درصد مایع کیسه منی، ۳۰ تا ۳۵ درصد از پروستات، و ۵ درصد از رگ ها تشکیل شده است.

مایع منی حاوی اسید سیتریک، اسید آمینه های آزاد، فروکتوز، آنزیم ها، فسفوریل کولین، پروتاگلاندین، پتاسیم و روی می باشد. میزان مایع منی تولید شده از چند قطره تا ۶ میلی لیتر متغیر است

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، برحسب مقدار انزال و مدت زمان ذخیره قبل از انزال، یکبار انزال می تواند حاوی ۴۰ تا ۶۰۰ میلیون اسپرم باشد. اما با اینحال مقدار اسپرم تولید شده در کنار هم حتی نوک یک سوزن را هم نمی پوشاند

برای نمونه هایی که در تحقیقات پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرند از دهنده ها خواسته می شوند که خودارضایی کنند و یا اگر گرفتن نمونه بدون رابطه جنسی امکانپذیر نبود، آنوقت از کاندولوم های غیرواکنشی استفاده می شود

مایع منی از چه ساخته شده است؟

منی سالم دارای ۱۲۰ تا ۶۰۰ میلیون اسپرم در هر نوبت انزال است. مایع منی علاوه بر اسپرم دارای آب، قند های ساده، مواد قلیایی (برای محافظت در مقابل محیط اسیدی میزراه مرد و محیط اسیدی واژن زن است. همچنین در مایع منی موادی به نام پروستاگلاندین ها هستند که سبب انقباض رحم و لوله های تخدمانی می شوند. علاوه بر این موادی از قبیل ویتامین سی

روی و کلسترول نیز در مایع منی وجود دارند

بطور کلی مایع منی سالم، فاقد مواد میکروبی، و آلوده کننده است

در آزمایش چه مواردی اندازه گیری می شوند؟

حجم مایع منی

تعداد اسپرم (مقدار اسپرم در حجم معینی از مایع منی)

اندازه و شکل اسپرم

تحرک اسپرم (در صد اسپرم های فعال)

اکنون با استفاده از کامپیوتر تمام موارد فوق ارزیابی می شوند

مایع منی سالم چه مشخصاتی دارد؟

حجم: ۳ میلی لیتر (بین ۲ تا ۶ میلی لیتر)

غلظت: ۲۰ میلیون یا بیشتر در هر میلی لیتر

تحرک/٪ ۵۰ فعال پس از ۲ ساعت

شکل طبیعی: ۶۰٪

مایع منی معمولاً در عرض ۱ ساعت به صورت مایع در می آید

بین ۷ تا ۸ PH:

آنالیز آزمایشگاهی منی

غیر طبیعی بودن آنالیز مایع منی به سادگی احتمال کاهش باروری را مطرح میسازد. مطابق مقادیر مشخص شده سازمان بهداشت جهانی شاخص های حد اقل نرمال کیفیت مایع منی به این ترتیب است

حد اقل حجم : ۵,۵-۱,۵ سی سی

حد اقل تعداد اسپرم در واحد یک سی سی: حد اقل ۲۰ میلیون

حرکت: بیش از ۵۰٪ اسپرم ها باید حرکت داشته باشند

forward progression:2

ظاهر آزمایشگاهی اسپرم ها: باید حد اقل ۳۰٪ اسپرم ها ظاهر نرمال داشته باشند

PH: 8-72

رنگ: خاکستری- سفید (گاهی زرد هم طبیعی هست)

قابلیت زنده ماندن و یا **viability**

بیش از ۶۵٪ طبیعی هست

progressive motility: 3+ or 4

totoal motile functional sperm

بیش از ۴۰ میلیون طبیعی هست که عددی هست که ضرب ۴ فاکتور در هم بدست می آید... که شامل حجم اسپرم در حرکت اسپرم در تعداد اسپرم در واحد در .. درصد ظاهر طبیعی اسپرم

تعداد گلbul قرمز طبیعی: ۵-۰

تعداد گلbul سفید چرکی طبیعی: ۵-۰

کریستال: اصلا نباید باشد

(clumping) حالت تکه تکه شدن و جمع شدن اسپرم ها در نمونه آزمایشگاهی

نباید وجود داشته باشه

mixed ant globulin reaction

منفی باید باشه

bovine cervical mucus penetration

باید بیش از ۳۰ میلی متر باشه

کشت باکتری در درون اسپرم: هیچ باکتری نباید رشد کنه

antisera antibody

منفی باید باشه

توصیه ها برای اینکه نمونه بهتری گرفته شود

۱-

توصیه میشود جمع آوری اسپرم ۷۲-۴۸ ساعت پس از آخرین مقاربت گرفته شود

۲-

برای بدست آوردن میزان پایه ای کیفیت اسپرم بایستی ۳ نمونه اسپرم گرفته شود اما اگر اختلاف ۲ نمونه کمتر از

۲۰٪

باشد ممکن است نیازی به نمونه سوم وجود نداشته باشد

۳-

نمونه مایع منی از طریق استمنا، آمیزش منقطع و یا کاندوم های مخصوص بدون مایع کشنده اسپرم جمع آوری میشود

۴-

نمونه باید داخل ظرف شیشه ای دهان گشاد تمیز (نیازی نیست استریل باشد) یا ظرف پلاستیکی ریخته میشود


۵-

مایع منی تازه بصورت لخته میباشد که در مدت ۳۰-۵ دقیقه بعد از انزال مایع میشود



Indication of semen analysis

اندیکاسون آنالیز مایع منی



- ✓ Reference
- ✓ How is testicular cancer diagnosed? (2012, May 14). American Cancer Society. Retrieved July 5, 2012, from <http://www.cancer.org/Cancer/TesticularCancer/DetailedGuide/testicular-cancer-diagnosis>
- ✓ Male infertility. (2011, January). American Urological Association Foundation. Retrieved July 5, 2012, from <http://www.urologyhealth.org/urology/index.cfm?article=102>
- ✓ Testicular biopsy. (2011, January 31). Kaiser Permanente. Retrieved July 7, 2012, from <http://healthy.kaiserpermanente.org/>
- ✓ Testicular biopsy. (2010, September 3). *MedlinePlus Medical Encyclopedia*. Retrieved July 5, 2012, from <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003908.htm>

Hydrosalpinography

هیستروسالپینوگرافی

برای بررسی علت تأخیر باروری، باید سلامت اندام‌های تولیدمثل مورد ارزیابی قرار گیرند. یکی از روش‌های تشخیصی که معمولاً برای بررسی رحم و لوله‌های رحمی همراه با سایر آزمایش‌ها در ویژت‌های اولیه درخواست می‌شود، هیستروسالپینوگرافی است.

با این تست، پزشک از وضعیت داخلی رحم و لوله‌های رحمی مطلع می‌گردد و با توجه به نتایج حاصل از تست، در مورد نحوه درمان تصمیم خواهد گرفت.

هیستروسالپینوگرافی روشی است که به منظور بررسی داخل رحم و لوله‌های رحمی انجام می‌گیرد. انجام هیستروسالپینوگرافی در ارزیابی ناباروری بسیار مهم است. در صورت انسداد لوله‌های رحمی و یا وجود چسبندگی رحم، شانس باروری کاهش می‌یابد.

و ماده حاجب چسبندگی‌های درون رحمی، پولیپ، فیبروم و برخی دیگر مشکلاتی که سبب خود در این روش با استفاده از اشعه انسداد لوله‌ها و جلوگیری از لقاح تخمک و اسپرم می‌گردد، قابل تشخیص است. آزمایش دیگری که در این راستا مفید خواهد بود هیستروسونوگرافی می‌باشد که با استفاده از سونوگرافی و تزریق محلولی خاص، ناهنجاری‌های درون رحمی بررسی می‌شود.

مراحل انجام هیستروسالپینوگرافی

معمولًا عکس رنگی رحم توسط رادیولوژیست انجام می‌شود و به طور متوسط در حدود ۱۰-۳۰ دقیقه به طول می‌انجامد. برای انجام این تست، فرد بر روی تخت معاینه زنان قرار می‌گیرد. ابتدا پزشک یک اسپیکولوم (وسیله‌ای برای معاینه داخلی زنان) در واژن قرار می‌دهد.

سپس لوله‌ای بسیار ظریف از درون دهانه رحم به داخل رحم وارد نموده تا این طریق ماده حاجب را به درون رحم و لوله‌های رحمی تزریق نماید. به‌طور طبیعی ماده حاجب باید رحم و لوله‌های رحمی را پر نماید یعنی هنگامی که در رحم و لوله‌ها هیچ‌گونه انسداد و مشکلی وجود نداشته باشد ماده حاجب بعد از تزریق، فضای داخل رحم و لوله‌ها را به‌طور یکنواخت پر خواهد کرد.؛ ولی در مورد انسداد لوله‌ای ماده حاجب نمی‌تواند تمام فضای داخل رحم و لوله‌ها را پر نماید.

بعد از تزریق، از رحم عکس‌برداری می‌شود. پزشک با بررسی عکس‌ها می‌تواند وضعیت رحم و لوله‌های رحمی را ارزیابی نماید.

به‌دلیل انقباض عضلات رحم، بسیاری از زنان احساس درد خفیف، به‌خصوص در زمان تزریق ماده حاجب دارند، در مواردی که لوله‌های رحمی مسدود است، درد بیشتری احساس می‌شود.


صرف داروهای مسکن مانند ایبوبروفن می‌تواند در تسکین درد و ناراحتی موثر باشد. لذا ممکن است ۳۰-۶۰ دقیقه قبل از انجام عکس رنگی، یک داروی مسکن جهت بیمار تجویز شود. به‌طورکلی بسیاری از زنان در حین هیستروسالپنگوگرافی مشکلی خواهند داشت اما ممکن است مدتی پس از آن احساس درد و ناراحتی نمایند، بنابراین بهتر است در روز گرفتن عکس رنگی از رحم، یک نفر فرد را همراهی نماید.

معمولًا این روش عوارضی ندارد ولی عوارض نادر آن شامل: درد خفیف، عفونت، لکه‌بینی و یا خونریزی می‌باشد. در صورت تب و تداوم درد به مدت چند روز، باید به پزشک اطلاع داده شود. بهترین زمان انجام این تست، پس از اتمام خونریزی قاعده‌گی و قبل از تخم‌گذاری است.

در موارد عفونت و التهاب لگنی و خونریزی‌های نامشخص واژینال، انجام این تست ممنوع است و تا بهبودی کامل، فرد باید از انجام این تست خودداری نماید.


Indication of hysterosalpingography

اندیکاسیون هیستروسالپینگوگرافی



Complication of hysterosalpingography

عوارض هیستروسالپینگوگرافی



- ✓ Reference
- ✓ Hysterosalpingography FAQ. (2011, August). *The American College of Obstetrics and Gynecologists*. Retrieved June 28, 2012, from <http://www.acog.org/~/media/For%20Patients/faq143.pdf?dmc=1&ts=20120628T1946589168>
- ✓ Hysterosalpingography (Uterosalpingography). (2012, April 24). *American College of Radiology*. Retrieved June 28, 2012, from <http://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=hysterosalp>
- ✓ Patient safety: contrast materials. (2012, April 24). *American College of Radiology*. Retrieved July 4, 2012, from http://www.radiologyinfo.org/en/safety/index.cfm?pg=sfty_contrast
- ✓ Zieve, D., & Storck, S. (2012, February 26). Hysterosalpingography. *National Institutes of Health*. Retrieved June 28, 2012, from <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003404.htm>

Progesterone test

تست پروژسترون

پروژسترون برای سیستم تولید مثل ما بسیار مهم است. پروژسترون یکی از هورمون هایی است که نقش حیاتی در تنظیم بسیاری از عملکردهای بدن ، خصوصا سیکل قاعدگی یک زن ایفا می کند. همچنین نقش مهمی در حفظ حاملگی ایفا می کند، بنابراین ضعف پروژسترون می تواند اثرات جدی داشته باشد.

در فاز لوتال سیکل قاعدگی، پروژسترون توسط فولیکول پاره شده تولید می شود. این تا زمانی که دوباره پریود آغاز شود ادامه دارد. سپس تولید آن کاهش می یابد که به معنای آغاز سیکلی جدید و سطوح پایین پروژسترون است.

نقش های دیگر پروژسترون:

- به طبیعی کردن سطوح قند خون کمک می کند.
- عملکرد تیرونید را تقویت می کند.
- به ما کمک می کند که از چربی برای دریافت انرژی استفاده کنیم.
- اثرات ضد التهابی مفیدی دارد.
- تورم و التهاب را کاهش می دهد.

علائم کمبود پروژسترون



بسیاری از نشانه های کمبود پروژسترون همچنین با علائم دیگر مشکلات سلامتی مشترکند، بنابراین هوشیار باشید که

فقط چون ممکن است برخی از این علائم را داشته باشید، به این معنی نیست که دارای پروژسترون پایین هستید:

فاز لوتنال کمتر از ۱۲ روز

میل به شکر

کیست تخدان

پایین بودن دمای پایه ای بدن

قاعده های نامنظم

نشانه های آرژی

التهاب مفاصل

لکه بینی در روزهای قبل از شروع پریود

لخته خون در حین قاعده

دستها و پاهای سرد

ناخن های شکننده

پاشنه های ترک خورده

کاهش تمایل جنسی

دردهای قاعده

افسردگی یا نگرانی

-	-	آکنه
-	-	خستگی
-	-	سینه پلی کیستیک
-	-	سندروم تخدان پلی کیستیک
-	-	مشکلات کیسه صفرا
-	-	افکار تیره و تار
-	-	سردرد و میگرن
-	-	ناباروری
-	-	خشکی واژن
-	-	تغییرات خلق و خو
-	-	افزایش وزن، خصوصا دور شکم

نکاتی درباره پروژسترون:

زینو استروژن باعث می شود ما در وضعیت غلبه استروژن قرار بگیریم. زینو استروژن از پلاستیک ها، هورمون های ترکیبی، گوشت های رایج در بازار و محصولات دامی می آیند. با ورود این هورمون به داخل بدن نتیجه کمبود پروژسترون است. اگر مادران در معرض آن قرار گرفته باشند، می توانند منجر به عملکرد نادرست فولیکول های تخدان دختران شان شود.

- دوره جنینی زندگی زمانی است که جسم تخدان تا بالاترین حد، نسبت به سمی بودن زینو هورمون ها حساس است.

- زینو هورمون ها در چربی حلالند (به این معنی است که بدن آنها را جذب و حفظ می کند) و تجزیه ناپذیرند.

- استرس سطح کورتیزول را افزایش می دهد که مانع از جذب پروژسترون توسط گیرنده های بدن می شود.

- استفاده از مقادیر بالای مکمل ها در مدت زمان طولانی می تواند منجر به عدم تعادل دیگری در بدن شود.

- ورزش سنگین مقادیر آنتی اکسیدان را در بدن کاهش می دهد. ورزش متعادل این مقادیر را افزایش می دهد.

تقویت کننده های طبیعی پروژسترون

۱- پروژسترون مانند دیگر هورمون های استروژنی از ترکیبی که از کلسترول مشتق می شود به دست می آید، بنابراین مطمئن شوید به اندازه کافی از لبنیات استفاده می کنید. چربی شیر یکی از بهترین منابع پروژسترون طبیعی است.

۲- گیاه ویتکس نیز مفید است زیرا همزمان استروژن را پایین می آورد و پروژسترون را بالا می برد.

۳- زردچوبه، خصوصاً زرد چوبه هندی، برای کمک به افزایش سطح پروژسترون بدن شناخته می شود. نظر بر این است که گیاهان دیگری مانند آویشن و پونه کوهی همین خاصیت را دارند.

۴- B6، خصوصاً ویتامین B۶، افزایش مصرف غذاهایی غنی از ویتامین

۵- پیروی از رژیمی با گوشت کمتر و محصولات دامی کمتر. زیرا هورمون هایی که به آنها می دهنده همانند استروژن در بدن عمل می کنند. از غذاهای ارگانیک و ترجیحاً تولیدات تغذیه شده با علف استفاده کنید.


۶- حتی المقدور از پلاستیک ها، غذاهای کنسرو شده، تمیز کننده های متداول و محصولات آرایشی استفاده نکنید. بیشتر آنها حاوی ترکیبات شبه استروژن هستند که باعث می شوند بدن دچار حالت غلبه استروژن شود.

- ۷- اطمینان حاصل کنید به اندازه کافی از منیزیوم استفاده می کنید.
- ۸- روزانه مقدار کافی پروتئین با هر وعده استفاده کنید. هورمون ها برای تولید نیازمند پروتئین هستند.
- ۹- مقدار زیادی سبزیجات و میوه خصوصا با برگ های سبز تیره مصرف کنید. این ریز مغذی ها برای تولید پروژسترون مهم هستند.
- ۱۰- مراقب غدد فوق کلیوی تان باشید. وقتی این غدد خسته می شوند(به خاطر استرشن های فیزیکی، عاطفی یا روانی مکرر) پیش ماده پروژسترون به جای پروژسترون، کورتیزول می سازد.
- ۱۱- بیشتر هورمون های ما در شب تولید می شوند و میزان نور اتاق به آنها علامت می دهد که کدامیک تولید شوند. در زمان های گذشته، قبل از الکتروسیتیه، زنان معمولا با ماه قمری قاعده می شدند. یعنی با شروع ماه (کمترین نور ماه) قاعده می شدند و هنگامی که ماه کامل بود نشانه های تخمک گذاری در آنها ظاهر می شد. بنابراین نظر برای است که در تاریکی مطلق بخوابید مگر در آن سه شبی که نور ماه بیشترین است و این باعث افزایش پروژسترون می شود.
- این تست، سطح پروژسترون در خون را اندازه گیری می کند. پروژسترون، هورمون استروئیدی است که نقش اصلی آن کمک به آماده سازی بدن زن برای بارداری است؛ این هورمون در پیوستگی با چند هورمون زنانه دیگر کار می کند آزمایش تیروئید، HCG، LH، FSH سطوح پروژسترون ممکن است همراه با آزمایش های دیگر مانند CBC آزمایش های انعقادی و شمارش کامل خون برای کمک به تعیین علت خونریزی غیرطبیعی رحم در زنان غیر باردار درخواست شود


این تست برای کمک به تشخیص علت ناباروری، تعیین انجام

تخمک

کمک به تشخیص حاملگی خارج از رحم یا عدم بارداری؛ پایش سلامت بارداری و کمک به تشخیص علت گذاری، خونریزی غیرطبیعی رحمی؛ یا در زمان های خاص در طول سیکل قاعدگی زن برای تعیین اینکه آیا/چه هنگامی تخمک گذاری می کند؛



Causes of high progesterone in serum علل افزایش پروگسترون



Reference

- <http://www.mayoclinic.com>
- Menopause. (n.d.). *National Library of Medicine - National Institutes of Health*. Retrieved February 8, 2012, from <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000894.htm>
- Menopause: What is menopause? (n.d.). *UCLA*. Retrieved February 8, 2012, from <http://obgyn.ucla.edu/body.cfm?id=192>